

ID: 2014-05-3881-T-3235

Тезис

Персашвили М.А., Утц Д.С.

Врожденный сифилис как медико-социальная проблема

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России, кафедра кожных и венерических болезней

Научный руководитель: д.м.н., профессор Утц С.Р.

В Российской Федерации сохраняется высокий уровень заболеваемости сифилисом (по данным государственной статистики за 2011 год 36,7 на 100 тыс. населения), в связи с чем вызывает тревогу поражение этой инфекцией беременных и возникновение реальной возможности внутриутробного инфицирования плода.

Дети, больные врожденным сифилисом, чаще рождаются у юных матерей, женщин, ведущих асоциальный образ жизни, планирующих отказ от ребенка и потому не состоящих на учете в женской консультации. Кроме того, широкое использование будущей матерью антибиотиков, а также интеркуррентные заболевания могут приводить к патоморфозу сифилиса, «стиранию» его классических симптомов и диагностическим ошибкам. Социальное значение врожденного сифилиса усугубляется значительным числом мертворождений и неонатальной смертностью от этой инфекции.

Цель: анализ статистических данных относительно сифилитической инфекции у беременных и случаев врожденного сифилиса за период с 2010 по 2012 год по Саратовской области. Основные клинические признаки врожденного сифилиса. Профилактика.

Материал и методы. Согласно статистическим данным Саратовского областного кожно-венерологического диспансера только за 2012 год в Саратовской области зарегистрировано 90 беременных, больных сифилисом, 4 случая сифилиса у детей в возрасте от 0 до 14 лет, из них 1 случай раннего врожденного сифилиса.

Выводы. Таким образом, заболеваемость сифилисом среди беременных женщин является важной и актуальной проблемой, которая требует активизации и своевременного проведения профилактических мероприятий с целью предупреждения врожденного сифилиса.

Ключевые слова: врожденный сифилис, сифилис беременных, профилактика